



Botritis en naranjas

Estamos en...

Sede Social

Calle Trinquet, 4
Tel. 961 602 751
Fax 961 691 936
46117 Bétera (Valencia)
atencionsocio@coabe.es

Hortofrutícola

Camino Alcublas, s/n
Tel. 961 600 121
Fax 961 601 513
46117 Bétera (Valencia)
citricos@coabe.es



Centre La Vereda

Camino Alcublas, s/n
Tel. 961 602 396
Fax 961 601 513
46117 Bétera (Valencia)
vereda@coabe.es



GLOBALG.A.P.



Los artículos de este boletín son meramente informativos, para cualquier duda o aclaración consulte con el Departamento Técnico Agrícola de la Cooperativa, atendido por Francisco Alufre, Ingeniero Técnico Agrícola, sito en las instalaciones del Centre La Vereda.

La botritis es un hongo que se desarrolla en tejido vegetal en descomposición y tiene la particularidad de poder atacar a tejido vegetal vivo que se encuentre en contacto con él. Es un hongo típico de cultivos hortícolas que no ataca a los cítricos y no le produce ningún daño. No obstante, sí que puede producir daños en los frutos si se dan unas condiciones especiales, tal y como se pudo observar hace unos años, especialmente en las variedades del grupo Navel, o este año que como consecuencia de los ponientes de primavera no ha aparecido.

El daño que producen en los cítricos son manchas que se observan en la superficie del fruto, siendo estas de forma irregular, superficial y de color marrón claro que se suelen confundir con rameados o trips. El momento del daño se produce cuando coincide la caída de pétalos de la flor con humedades o lluvias persistentes, provocando que el pétalo se quede adherido al fruto en desarrollo, siendo entonces cuando la botritis que se encuentra en el pétalo se desarrolla y ataca la superficie del fruto manchándolo.

Por lo expuesto anteriormente, es importante estar atentos a las condiciones climatológicas durante la caída de pétalos para realizar un tratamiento fungicida y así evitar este daño que provoca importante destrucción en el almacén de confección.

TRATAMIENTO DE LA PHYTOPHTHORA

Esta enfermedad, también conocida como "gomosis" o "amarillamiento" de los cítricos, siempre conviene tenerla en cuenta y ante la sospecha de que el campo o determinados árboles la tengan conviene iniciar los tratamientos. El tratamiento a realizar en riego localizado y cuando las brotaciones tengan entre 8 – 10 cm. es:

Diámetro de copa del árbol	Gramos por árbol de Metalaxil	Gramos por árbol de Foseñil-AI
0,5 m	0.2	3
1 m	0.8	5
1,5 m	1.8	7
2 m	3.2	10
2,5 m	5	12
3 m	7	15
+3 m	8	20

TRATAMIENTOS DE CUAJADO

Respecto de las variedades que responden satisfactoriamente a los tratamientos con ácido giberélico, podemos decir que corresponden casi exclusivamente al grupo de clementinas, no siendo efectivos los tratamientos sobre otras variedades, con la excepción de la naranja Navelate que parece mostrar un cierto efecto al tratamiento, si bien las experiencias son contradictorias.

RESPUESTA DE LAS VARIEDADES DE CLEMENTINAS AL ÁCIDO GIBERÉLICO.

- Respuesta importante: Clementina de Nules, Orogrande, Fina, Oronules. En estas variedades el tratamiento es fundamental.
- Respuesta moderada: Clementina Loterina, Oroval, hernandina, Arrufatina. El tratamiento sólo se realizará en los campos con cuajado deficiente.
- Sin respuesta: Clementina Esbal, Beatriz, Clementinas extratempranas. No es necesario realizar tratamientos.

Riego orientativo para el mes de marzo 2016

Diámetro de copa	Litros/Árbol y semana	Grs./Árbol y semana Cristalino 19-5-7+m.e.
25 cm.	10	1.4
50 cm.	14	3.25
75 cm.	21	4.25
1 m.	31	5.25
1.5 m	50	7.25
2 m.	98	11
2.5 m.	148	33
3 m.	171	40.25
3.5 m.	190	53.75
4 m.	214	67
5 m.	278	72.75

- Las necesidades de riego y abono están calculadas sobre una plantación con un marco de 5 x 4, y son meramente orientativas.
- Se ha seleccionado una distribución de abonado Marzo–Octubre para diámetros de copa entre 0.25-2 m., y de Marzo–Septiembre para diámetros de copa entre 2.5-5 m.
- Es conveniente que los riegos tengan siempre la misma duración que oscilará entre 2 y 3 horas según edad y tipo de tierra.



Cuidar tus árboles frutales es muy fácil (IV)

PLAGAS DE INSECTOS

Los insectos que pueden atacar nuestros árboles son muy diversos y cada cuál, más o menos peligroso para el buen desarrollo de éstos.

Para su prevención la práctica más eficaz es realizar tratamientos con aceites específicos, en invierno en ramas y troncos, y en verano aplicándolo también a las hojas. Estos aceites evitarán y eliminarán todos los posibles huevos y larvas que muchos insectos depositan en las ramas, cortezas y hojas.

Otros insectos estacionales pueden aparecer atacando las hojas y brotes tiernos, como son los pulgones (pequeños insectos negros o verdes), la mosca blanca (pequeños insectos voladores de color blanco), araña roja (diminutos ácaros que dejan en el envés de las hojas una pelusilla rojiza o anaranjada). Aparecen en mayor o menor cuantía según el año, pero su erradicación es más o menos fácil utilizando insecticidas o productos biológicos específicos. Siempre debemos observar nuestro jardín para atacar el problema en su inicio, evitando que se extienda a otras plantas y gastando la menor cantidad posible de producto.

Para prevenir estas apariciones, tanto de hongos como de plagas, lo más efectivo es realizar buenas prácticas culturales como un correcto abonado, eliminar restos de poda, hojas muertas y frutos del suelo, evitar la falta de agua y también encharcamientos prolongados, limpiar y tratar los troncos y ramas, podar las ramas muy viejas y agrietadas, utilizar herramientas limpias y, en definitiva, cuidar el árbol y vigilarlo.

COABE pone a su disposición un SERVICIO DE CULTIVOS, que realiza los trabajos y tratamientos necesarios en el campo.

Si desea más información puede consultar con nuestros técnicos agrícolas en el Almacén de Productos Agrícolas y de Jardinería:

Centre La Vereda

Camino Alcublas, s/n | 46117 Bétera | Telf. 96 160 23 96

Horario de atención al público:

· De Lunes a viernes de 07:30 a 13:30 y de 15:30 a 18:00

· Sábados de 07:30 a 13:30

EL SEGURO DE MASCOTAS/CABALLOS



Existen pólizas en el mercado que, al igual que los seguros médicos para la persona, otorgan cobertura sanitaria para mascotas y caballos y cuyas principales garantías son:

- Hospitalización.
- Asistencia domiciliaria.
- Intervenciones quirúrgicas.
- Pruebas Diagnósticas.
- Sacrificio del animal.
- Etc...

Estos seguros cubren la asistencia veterinaria, tanto por enfermedad como por accidente, dependiendo los gastos cubiertos por la póliza del tipo de la asistencia que se realice.

Como norma general, estos gastos pueden ser:

- Por enfermedad: análisis de laboratorio, pruebas diagnósticas, anestesia, intervención quirúrgica, postoperatorio, medicamentos, hospitalización...
- Por accidente: material quirúrgico, exploraciones, radiografías, curas, estancia en clínica, prótesis...

Además, existe la posibilidad de contratar conjuntamente la Responsabilidad Civil, por el daño que nuestra mascota o caballo pudiese producir a un tercero, pudiéndose contratar otras coberturas opcionales como:

- Capital por fallecimiento.
- Asistencia en Viaje.
- Cuidado durante la estancia de vacaciones.

Aunque es un seguro diseñado para perros, gatos y caballos, se pueden asegurar otro tipo de animales como pájaros, hámsteres, tortugas, etc...

Más información en:

Engrupo Correduría de Seguros – Sucursal Bétera

Trinquet, 4 (46117 Bétera) | Telf. 96 160 27 51

Email: seguros@coabe.es

Horario de Atención al Público:

De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00