



TRATAMIENTOS DE VERANO

Estamos en...

Sede Social
Calle Trinquet, 4
Tel. 961 602 751
Fax 961 691 936
46117 Bétera (Valencia)
atencionsocio@coabe.es

Frutícola
Camino Alcublas, s/n
Tel. 961 600 121
Fax 961 601 513
46117 Bétera (Valencia)
citricos@coabe.es



Centre La Vereda
Camino Alcublas, s/n
Tel. 961 602 396
Fax 961 601 513
46117 Bétera (Valencia)
vereda@coabe.es



GLOBAL G.A.P.



Los artículos de este boletín son meramente informativos, para cualquier duda o aclaración consulte con el Departamento Técnico Agrícola de la Cooperativa, atendido por Francisco Alufre, Ingeniero Técnico Agrícola, sito en las instalaciones del Centre La Vereda.

TRATAMIENTO DE LA PIEL - CLARETA -

Insistir en la importancia de este tratamiento pues, como viene siendo habitual en los últimos años, la climatología extrema que estamos viviendo probablemente provoque alteraciones en la piel de los cítricos por un envejecimiento prematuro de ésta, tal y como paso la pasada campaña de cítricos con el "pixat" de la clemenules, la clareta en Navelinas o el deshidratado en Lane Lates.

TRATAMIENTO DE LA PHYTOPHTHORA

Esta enfermedad, también conocida como "gomosis" o "amarillamiento" de los cítricos, se ve favorecida por diversos factores y no conviene descartarla.

Este tratamiento consta de tres aplicaciones al año, uno en primavera (marzo-abril), otro en verano (julio) y el último en otoño (septiembre-octubre). Es importante en campos afectados por la enfermedad realizar los tres tratamientos para evitar que la enfermedad se recupere.

EL COTONET

Esta plaga afecta principalmente a las variedades de grupo navel y a la ortanique, siendo la mejor forma de prevenir el ataque del cotonet la de realizar sueltas de su depredador natural *Cryptolaemus montrouzieri*, el cual se reparte gratuitamente en las instalaciones que tiene el Ayuntamiento junto al Calvario.

PIOJO ROJO DE CALIFORNIA -2ª GENERACIÓN-

A primeros de agosto se suele producir la 2ª generación de esta plaga, siendo importante estar atentos a las fechas de tratamiento, especialmente en los siguientes casos:

Campos no tratados en 1ª generación: el tratamiento de verano se debería hacer coincidir con la 2ª generación.

Variedades extratempranas (Marisol, okitsu, clemenpons...). En estas variedades no se debe retrasar el tratamiento de verano para evitar la aparición de manchas verdes durante el desverdizado debido a la aplicación tardía de aceites, así como evitar problemas de residuos por plaguicidas.

Campos que habiendo sido tratados en 1ª generación, se observa ataque: en este caso es conveniente volver a repetir el tratamiento. Si se observa un ataque fuerte consultar en el almacén de abonos. En las variedades tardías y de plena estación, si hemos realizado el tratamiento de 1ª generación podemos saltarnos este tratamiento y esperar a ver si nos aparece plaga, y en ese caso aún podríamos tratar en tercera generación que es cuando se suele producir un mayor ataque de esta plaga en estas variedades (Navel, Lane Late, Hernandina...)

Tratamiento para PHYTOPHTHORA

| Diámetro de copa | Gramos por árbol de Foseñil-AI |
|------------------|--------------------------------|
| 0,5 m | 3 |
| 1 m | 5 |
| 1,5 m | 7 |
| 2 m. | 10 |
| 2.5 m | 12 |
| 3 m. | 15 |
| + 3 m. | 20 |

Riego y Abonado para JULIO

| Diámetro de copa | Litros/Árbol y semana | Grs./Árbol y semana Cristalino 17-4-14+m.e. |
|------------------|-----------------------|---|
| 25 cm. | 25 | 7,5 |
| 50 cm. | 35 | 15 |
| 75 cm. | 53 | 19,5 |
| 1 m. | 77 | 23,5 |
| 1.5 m | 160 | 32,5 |
| 2 m. | 245 | 48,5 |
| 2.5 m. | 370 | 73,5 |
| 3 m. | 425 | 90 |
| 3.5 m. | 475 | 120 |
| 4 m. | 537 | 150 |
| 5 m. | 695 | 162,5 |

- Las necesidades de riego y abono están calculadas sobre una plantación con un marco de 5 x 4, y son meramente orientativas.
- Se ha seleccionado una distribución de abonado Marzo-Octubre para diámetros de copa entre 0.25-2 m., y de Marzo-Septiembre para diámetros de copa entre 2.5-5 m.
- Es conveniente que los riegos tengan siempre la misma duración que oscilará entre 2 y 3 horas según edad y tipo de tierra.



RECONVERSIÓN VARIETAL

Desde siempre, en la agricultura ha habido cultivos que han valido dinero y otros cultivos en los que el agricultor no ha sacado nada o incluso, ha perdido.

Hoy en día en nuestra citricultura ocurre lo mismo, existen variedades que valen dinero y variedades que cuestan dinero del bolsillo del agricultor, y es habitual percibir cómo, el desánimo se apodera de muchos productores por la falta de rentabilidad como consecuencia del alto coste del cultivo, unido a los precios cada vez más bajos.

Es por ello, que COABE, desde su Sección Frutícola, lleva desde el año 2010 apoyando la reconversión varietal con ayudas a fondo perdido que llegan al 50% del material vegetal y de la instalación de riego localizado. También financia el 100% de la inversión inicial hasta la puesta en marcha del cultivo SIN INTERESES y con dos años de cadencia, todo enfocado a conseguir la renovación de nuestros cultivos para que estos vuelvan a ser rentables.

Si desea más información puede acudir al Departamento Técnico de la Cooperativa donde será atendido por nuestros técnicos agrícolas, Paco Alufre o Laura Chapa.

HORARIO DE ATENCIÓN: De Lunes a viernes de 07:30 a 13:30 y de 15:30 a 18:00 h. Sábados de 07:30 a 13:30



ITV EN LAS INSTALACIONES DE LA VEREDA

Del 3 de julio al 14 de agosto de 2017
De lunes a jueves de 9:00 a 17:30 h.
Viernes y vísperas de festivo de 9:00 a 14:30 h.



Búscanos en las redes sociales
www.coabe.es