



MEJORA DE LA CONSERVACIÓN EN EL ÁRBOL DE DE LA CLEMENULES Y MANDARINAS TARDÍAS

Estamos en...

Sede Social

Calle Trinquet, 4
Tel. 961 602 751
Fax 961 691 936
46117 Bétera (Valencia)
atencionsocio@coabe.es

Frutícola

Camino Alcublas, s/n
Tel. 961 600 121
Fax 961 601 513
46117 Bétera (Valencia)
citricos@coabe.es



Centre La Vereda

Camino Alcublas, s/n
Tel. 961 602 396
Fax 961 601 513
46117 Bétera (Valencia)
vereda@coabe.es



GLOBAL G.A.P.



Los artículos de este boletín son meramente informativos, para cualquier duda o aclaración consulte con el Departamento Técnico Agrícola de la Cooperativa, atendido por Francisco Alufre, Ingeniero Técnico Agrícola, sito en las instalaciones del Centre La Vereda.

Quien esté interesado en mantener la fruta en el árbol ha de tener en cuenta el tratamiento de conservación de la piel, pues se está observando un adelanto en la maduración, un exceso de producción y la previsión de un otoño lluvioso, lo que con el tiempo puede envejecerla prematuramente, pudiendo ser entonces afectada por una serie de alteraciones de la corteza asociadas con el envejecimiento de la piel, conocidas con el nombre de "pixat", "planxat" o "clavillet" que le hacen perder su valor comercial.

Este tipo de alteraciones asociadas a la maduración pueden ser reducidas mediante la aplicación de sustancias hormonales, en concreto el ácido giberélico, que retrasa el envejecimiento de la corteza. Los resultados dependen fundamentalmente de la época de aplicación, concentración aplicada y las condiciones climáticas a que se vea sometida la fruta. En todos los casos se obtiene un incremento del porcentaje de frutos sanos que se recolectan.

La época de realización de los tratamientos con ácido giberélico puede variar en función de los resultados buscados. Así, la aplicación en el momento del cambio de color retrasa el envejecimiento de la corteza con un ligero retraso en la coloración del fruto.

Los campos de CLEMENULES que se encuentren en la sección de cítricos de la Cooperativa, NO DEBEN REALIZAR ESTE TRATAMIENTO, por ser la Cooperativa la encargada de realizarlo en función de la época prevista de recolección de cada campo y respecto a las variedades SAFOR Y GARBÍ recordar la importancia de este tratamiento pues es una fruta que todavía ha de estar mucho tiempo en el árbol.

BABOSAS Y CARACOLES

Hay que tener especial cuidado con las babosas porque suelen pasar desapercibidas.

Respecto a los caracoles, como consecuencia del verano lluvioso que hemos tenido, es posible que adelante la generación de primavera al otoño, lo que puede provocar graves daños en la cosecha de algunos huertos, pues son los caracoles pequeños los que más daños producen. La mejor forma de detectarlos es coger una rama y moverla enérgicamente para observar si caen.

EL AGUADO DE LOS CÍTRICOS

Todas las frutas que han iniciado el cambio de color son sensibles al aguado. Esta podredumbre del fruto, está producida por el hongo del suelo Phytophthora (también responsable de la gomosis), que al llover salta junto con la tierra a la fruta.

Para evitar el aguado se recomienda dejar una cubierta vegetal para evitar las salpicaduras de tierra, o bien hacer tratamientos preventivos con cobre, mancozeb o fosetil-Al. Estos productos pueden mezclarse con los utilizados tanto para la conservación como para el "pezón".

TRAMIENTOS DEL "PEZÓN"

En aquellas variedades sensibles a la caída (variedades del grupo Navel, clemenvilla y hernandina) por exceso de maduración, cambios bruscos de temperatura o exceso de humedad, se recomienda tratar. Estos productos son compatibles con cualquiera de los anteriores, por lo que se puede aprovechar el mismo tratamiento para añadirlos. Recordar que se ha vuelto a autorizar el 2,4-D.

Riego orientativo para noviembre 2018

Diámetro de copa	Litros/Árbol y semana
25 cm.	9
50 cm.	13
75 cm.	19
1 m.	28
1.5 m.	53
2 m.	86
2.5 m.	130
3 m.	150
3.5 m.	167
4 m.	185
5 m.	240

- Las necesidades de riego están calculadas sobre una plantación con un marco de 5 x 4, y son meramente orientativas, por lo que se deberán disminuir en caso de lluvia o aumentar si hubiera altas temperaturas.

- Por diámetro de copa, se entiende la distancia entre dos puntos de la falda del árbol en línea recta y pasando por el tronco del mismo.

- Es conveniente que los riegos tengan siempre la misma duración que oscilará entre 2 y 3 horas según edad y tipo de tierra.

TRIANGLE

DESDE
59,30 €/UD*

Consulta todas las medidas en oferta en el
Taller de Reparación de Vehículos

OFERTA RUEDAS FURGONETAS

Incluye montaje, ecotasa, colocación, equilibrado e IVA.
Oferta válida hasta fin de existencias.



Camino Alcublas, s/n (Bétera)
Telf. 961 602 396
Email: taller@coabe.es



Lunes a viernes 8:00 - 13:30
16:00 - 18:30
Sábados 8:00 - 13:30



www.coabe.es



COABE
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE BÉTERA
COOP. V.

PROMOCIÓN BATERÍAS

Batería YUASA 45Ah	76 €
Batería YUASA 60Ah	100 €
Batería YUASA 75Ah	120 €
Batería YUASA 90Ah y 95Ah	150 €

Incluye montaje e IVA.
Baterías fabricadas por YUASA.
Promoción válida hasta fin de existencias.



Camino Alcublas, s/n (Bétera)
Telf. 961 602 396
Email: taller@coabe.es



Lunes a viernes 8:00 - 13:30
16:00 - 18:30
Sábados 8:00 - 13:30



Búscanos en las redes sociales
www.coabe.es